Descripción

Los espacios litorales de Las Salinas de Marchamalo y Playa de las Amoladeras, Saladar de lo Poyo, Marina del Carmolí y Playa de la Hita, constituyen un sistema de humedales ribereños del Mar Menor.

En la **Playa de las Amoladeras** aparece vegetación de arenales costeros y dunas de gran interés. Este espacio es utilizado por numerosas especies de aves para nidificar, para alimentarse o simplemente como sitio de refugio. Podemos observar el vuelo de avocetas, charrancitos, chorlitejos, garzas reales y hasta flamencos.

Las **Salinas de Marchamalo** están constituidas por un humedal con salinas costeras aún hoy en activo, donde habita el Fartet y la vegetación dominante es el saladar. Por su parte, el Salazar de Lo Poyo, junto a los Nietos, está constituido por una laguna litoral, transformada en la antigüedad en salinas, hoy abandonadas. Entre su fauna destacan especies nidificantes como el chorlitejo patinegro o el charrancito común.

La **Playa de la Hita** está formada por un conjunto de pequeñas charcas someras rodeas de vegetación de saladar y carrizal, hábitats catalogados de interés comunitario. De su fauna se puede destacar el sapo corredor, fartet y aves como la cigüeñuela, el alcaraván y la garceta común.

Finalmente, el espacio litoral de la **Marina del Carmolí**, dividida en dos claros sectores: una franja costera arenosa y una zona interior donde destaca una excepcional comunidad de albardinal costero, con especies esteparias como la terrera marismeña.

Playa de la Hita

Valoración

Los humedales constituyen uno de los importantes elementos ribereños del Mar Menor en los que se acumulan importantes especies de fauna y flora.